

Le fenouil commun sauvage

[Illustration Wikipedia](#)

Le fenouil commun sauvage, *Foeniculum vulgare* est une plante de la famille des Apiacées (anciennement Ombellifères). C'est une plante aromatique souvent utilisée en cuisine pour parfumer certains poissons ou les olives cassées.

Le fenouil a une variété cultivée qui développe un gros bulbe blanc comestible, très apprécié cru (en salade) ou cuit. La variété sauvage développe un court rhizome. Elle se développe le long des routes, dans les friches ou dans les oliveraies. Dans certaines friches, elle envahit tout l'espace.

Le fenouil commun fleurit en août-septembre et forme des ombelles de fleurs. Les tiges ont alors atteint près de 2m de hauteur.

Parasites

Les ombelles du fenouil sont visitées par un parasite dont la ponte provoque des galles. Il s'agit de *Lasioptera carophila*, une Cécidiomyidée. Ce parasite pond un oeuf au point d'insertion d'une ombellule, vers la fin août.

Parasitoïdes

Plusieurs parasitoïdes vont venir pondre sur les larves de la *Lasioptera*. ce sont des Eupelmidés, des Eulophidés, des Eurytomidés et des Torimidés. Seuls les Eupelmidés et un Eulophidé (*Pnigalio* sp.) vont s'intéresser aux *Bactrocera oleae*, lorsqu'ils vont émerger des galles en octobre.